

NICOMEX PLUS WG – Erbicid



Substanța activă: Nicosulfuron 700 g/l + Tifensulfuron-metil 125 g/l WG
Forma preparativă: Granule dispersabile în apă
Cultura: Porumb

Beneficii:

- Erbicid postemergent cu spectru larg
- Eficiență mare mai ales împotriva buruienilor dificile
- Eficacitate pe perioadă îndelungată
- Puterea a două substanțe active într-un singur produs pentru beneficii maxime

Aplicarea de **Nicomex Plus** necesită utilizarea surfactantului Agronex Pro pentru a asigura umiditate optimă și absorbția de către buruieni. Agronex Pro ajută la creșterea semnificativă a eficacității și selectivității.

Cultura	Norma de consum a preparatului	Denumirea științifică	Denumirea populară	Modul, perioada și limitele de utilizare	Numărul maximal de tratamente
Porumb	60 – 70 + SAS Agronex Pro 150-200 ml/ha	buruieni dicotiledonate anuale și monocotiledonate anuale și perene	-	Prin stropirea semanaturilor în faza de 3-5 frunze a culturii în fazele initiale de dezvoltare a buruienilor	- (1)

CLIOMEX 300 SL – Erbicid



Substanța activă: Clopiralid 300 g/l SL
Forma preparativă: Concentrat solubil
Cultura: Sfeclă de zahăr, Rapiță

Beneficii:

- Investiția corectă pentru beneficii maxime
- Eficiență mare pentru culturi de lungă durată
- Poate fi folosit în siguranță pe o varietate de culturi
- Reduce semnificativ buruienile dificile din culturi
- Ușor de utilizat, sferă largă de aplicare
- Excelent în gestionarea buruienilor rezistente

Cultura	Norma de consum a preparatului	Denumirea științifică	Denumirea populară	Modul, perioada și limitele de utilizare	Numărul maximal de tratamente
Sfeclă de zahăr	0.5 l/ha	Cirsium spp. Polygonum spp. Anthemis spp. Sonchus spp.	Specii de pălămidă Hrișcă Romaniță Susai	Prin stropirea semănăturilor în faza de 2-3 perechi de frunze adevărate a culturii	- (1)
Rapiță	0.3-0.5 l/ha	Cirsium spp. Polygonum spp. Anthemis spp. Sonchus spp.	Specii de pălămidă Hrișcă Romaniță Susai	Prin stropirea semănăturilor în faza de 3-4 frunze a culturii	- (1)

MEGASTAR 75 WG – Erbucid



Substanța activă: Tribenuron-metil 750 g/Kg WG
Forma preparativă: Granule dispersabile în apă
Cultura: Grâu

Beneficii:

- Aplicat în doze mici postemergent
- Selectiv pentru grâu, porumb, orz, triticale
- Spectru larg de buruieni cu frunze mari
- Spectru larg de aplicare

Cultura	Norma de consum a preparatului	Denumirea științifică	Denumirea populară	Modul, perioada și limitele de utilizare	Numărul maximal de tratamente
Grâu	15-25 g/ha	buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și unele perene	buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și unele perene	Prin stropirea semănașurilor în faza de înfrățire a culturii	- (1)

Quizamex 50 EC - Erbicid



Substanța activă: Quizalofop-p-etil 50 g/l EC
Forma preparativă: Concentrat emulsionabil
Cultura: Sfeclă de zahăr

Beneficii:

- Controlează cele mai importante ierburi anuale și perene, incluzând plantele perene din rizomi și lăstari subterani;
- Foarte eficient în doze mici;
- Absorbit rapid de suprafața frunzelor a buruienilor;
- Ploaia după o oră de la aplicarea tratamentului nu afectează eficacitatea produsului;
- Primele semne se pot observa în primele două zile de la tratament;
- Se descompune ușor în sol și apă, fără efecte adverse asupra culturilor crescute în zonele tratate;
- Nu există niciun pericol sau restricții pentru culturile viitoare;

Cultura	Norma de consum a preparatului	Denumirea științifică	Denumirea populară	Modul, perioada și limitele de utilizare	Numărul maximal de tratamente
Sfeclă de zahăr	1.0	buruieni monocotiledonate anuale	-	Prin stropirea semănăturilor în faza de 2-3 frunze a buruienilor anuale	- (1)
Sfeclă de zahăr	2.0	buruieni monocotiledonate anuale	-	Prin stropirea semănăturilor în faza de 2-3 frunze a buruienilor anuale	- (1)

Glyomex 360 SL – Erbucid



Substanța activă: Glifosat 360 g/l SL
Forma preparativă: Concentrat solubil
Cultura: Stropirea în toamnă, în faza de creștere a buruienilor, a câmpurilor după recoltarea culturilor agricole.

Beneficii:

- Erbucid cu eficiență sistemică foarte mare, neselectiv ("total") pentru controlul ierburilor anuale sau perene
- Aplicare ușoară, cu spectru larg de acțiune
- Fără efecte reziduale, crescând randamentul și profitabilitatea
- De cele mai multe ori o singură aplicare a produsului este suficientă, în timp ce alte metode necesită utilizare repetată
- Ușor de utilizat, acționează repede, ierburile pot fi înlăturate imediat în situații critice
- Glyomex este relativ sigur pe terenuri susceptibile de eroziune

Cultura	Norma de consum a preparatului	Denumirea științifică	Denumirea populară	Modul, perioada și limitele de utilizare	Numărul maximal de tratamente
Câmpuri după recoltarea culturilor agricole	4.0 – 6.0 l/ha	burieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	Fusarioza Făinare Rugina brună Helmintosporioza	Prin stropire în perioada de creștere activă a buruienilor, toamna după recoltare	- (1)

METAMEX 700 SC – Erbicid



Substanța activă: Metamitron 700 g/l SC
Forma preparativă: Suspensie concentrată
Cultura: Sfeclă de zahăr

Beneficii:

- Selectivitate mare pentru sfecla de zahăr
- Absorbit de rădăcini și buruieni în procesul de germinație
- Folosit înainte sau după apariția buruienilor
- Flexibil în amestecuri

Cultura	Norma de consum a preparatului	Denumirea științifică	Denumirea populară	Modul, perioada și limitele de utilizare	Numărul maximal de tratamente
Sfeclă de zahăr	2.0+2.0+2.0 l/ha	buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale	-	Trei tratamente a semănturilor în faza de cotilidoane a buruienilor (contra valului 1, 2 și 3 de buruieni)	90 (3)