

SAMBO 50 CS - Insecticid



Substanța activă: Lambda-cihalotrin 50 g/l CS
Forma preparativă: Suspensie de capsule
Cultura: Grâu, Măr

Beneficii:

- Un singur produs cu activitate pe un spectru larg
- Înlăturare rapidă și rezistență maximă împotriva dăunătorilor
- Acțiune la contact, reziduală și asupra stomacului
- Eficient în doze mici pe o varietate de culturi
- Formulă superioară pentru a reduce toxicitatea la utilizare
- Rezistență la ploaie și la lumină pentru o protecție reziduală mare (10-14 zile)
- Ușor de integrat în majoritatea programelor de gestionare a insecticidelor
- Poate fi amestecat în siguranță cu o mare varietate de produse
- Ușor și flexibil de utilizat pe multe culturi

Cultura	Norma de consum a preparatului	Denumirea științifică	Denumirea populară	Modul, perioada și limitele de utilizare	Numărul maximal de tratamente
Grâu	0.15-0.20 l/ha	Haplothrips tritici Eurygaster integriceps Anisoplia austriaca	Tripsi Ploșnița asiatică Cărăbușelul spicelor	Prin stropire în perioada de vegetație	30 (2)
Măr	0.8 l/ha	Cydia pomonella	Viermele merelor	Prin stropire în perioada de vegetație	30 (2)

PIRIMEX 50 WG - Insecticid



Substanța activă: Pirimicarb 500 g/Kg WG
Forma preparativă: Granule dispersabile în apă
Cultura: Tutun, Măr.

Beneficii:

- Efect rapid și de lungă durată împotriva unui spectru larg de afide
- Acționează la contact, prin ingestie și fumigant
- Bland cu insectele benefice, permițând creșterea prădătorilor și crescând controlul biologic
- Aparține familiei carbamaților-partener cunoscut în programele de control al dăunătorilor

Cultura	Norma de consum a preparatului	Denumirea științifică	Denumirea populară	Modul, perioada și limitele de utilizare	Numărul maximal de tratamente
Măr	0.2 kg/ha	Aphis pomi	Păduchele verde al mărului	Prin stropire în perioada de vegetație	20 (1-2)
Tutun	0.25 - 0.35 kg/ha	Thrips tabaci Myzodes persicae	Tripsul tutunului Păduchele verde al piersicului	Prin stropire în perioada de vegetație	20 (1-2)